

Afdeling dermatologie/allergologie, locatie AZU

Azathioprine (Imuran®)

bij constitutioneel eczeem (CE)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel azathioprine te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

Bij constitutioneel eczeem (CE) is er sprake van een ontsteking van de huid t.g.v. een overdreven afweerreactie van het lichaam op onschuldige stoffen. Azathioprine remt deze afweerreactie van het lichaam, waardoor de ontsteking in de huid afneemt en het eczeem vermindert. Er is geen sprake van genezing van het eczeem. Azathioprine remt het ontstekingsproces op de langere termijn. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat het medicijn begint te werken. Soms wordt de behandeling met azathioprine in het begin gecombineerd met prednison (zie aparte folder), omdat dit middel wel snel effect heeft, maar minder geschikt is voor langdurige behandeling. Azathioprine wordt ook toegepast bij orgaantransplantaties en kwaadaardige tumoren, meestal echter in veel hogere doseringen.

Behandelmethode

- Azathioprine is de werkzame stof en is bekend onder de naam Imuran®.
- Er bestaan tabletten met 25 mg en 50 mg werkzame stof. De eerste

week wordt over het algemeen één tablet van 50 mg per dag voorgeschreven. Daarna worden meestal twee tabletten van 50 mg per dag voorgeschreven, of een dosering afhankelijk van uw gewicht.

- U kunt de tabletten doorslikken met voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt en/of kauwt, maar heel doorslikt.

Bijwerkingen

- Misselijkheid, braken, diaree.
- Verminderde eetlust.
- Ontsteking van het mondslijmvlies.
- Huiduitslag.
- Allergie.
- Koorts.
- Verhoogde vatbaarheid voor infecties.
- Afwijkingen in het bloedbeeld.
 - Verstoorde aanmaak witte bloedcellen en daardoor grotere kans op infecties
 - Verstoorde aanmaak bloedplaatjes en daardoor grotere kans op blauwe plekken, bloedneus.
- Verstoring van de functie van lever en alvleesklier.

Om de bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken zal er regelmatig controle van het bloed plaatsvinden.

Adviezen

- Lees de bijsluiter.
- Bespreek uw vragen met uw dermatoloog of huisarts
- Geef bij bezoeken aan andere artsen (ook tandarts) altijd aan dat u azathioprine gebruikt.
- Gebruik nooit meer dan de voor u voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik alcohol met mate. Dit in verband met “overprikkeling” van de lever.
- Als u geopereerd moet worden, hoeft de azathioprine niet te worden gestopt.
- Bij verschijnselen van infecties zoals koorts, verkoudheid, griep, hoesten, keelpijn, ernstige kortademigheid en steenpuisten, is overleg met uw dermatoloog of huisarts noodzakelijk: het kan zijn dat de azathioprine tijdelijk gestopt moet worden.
- Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw dermatoloog of huisarts noodzakelijk. Azathioprine is niet schadelijk voor de ongeboren vrucht. Als het echter mogelijk is wordt de azathioprine vaak uit voorzorg toch tijdens de zwangerschap gestaakt.
- Als u azathioprine gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.
- Mannen met een kinderwens kunnen azathioprine blijven gebruiken.
- Als u azathioprine gebruikt, is er geen bezwaar tegen de ‘grieprik’.
- Vaccinatie (nodig bij sommige verre reizen) met verzwakt levend virus, zoals het gele koorts vaccin gaat niet samen met het gebruik van azathioprine. Ook vaccinaties tegen bof, mazelen, rode hond (BMR) of tuberculose mogen niet samen met azathioprine worden gebruikt.

Vragen

Neem gerust contact op met de polikliniek dermatologie of allergologie van het UMC Utrecht als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen.

Telefoonnummers

polikliniek allergologie 088 75 563 31 (niet op woensdag) /

polikliniek dermatologie 088 75 588 75

Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie

Afdeling dermatologie/allergologie, locatie AZU

UMC Utrecht, Locatie AZU, Heidelberglaan 100, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

Tel 088 75 555 55

www.umcutrecht.nl

© 2009, UMC Utrecht, afdeling Interne en Externe Communicatie