


Prikinstructie antistollingsmedicijnen

- 1) Uw dokter vertelt u of u 1 of 2 keer per dag dit medicijn onder de huid moet inspuiten.
- 2) Was uw handen. Zet alles klaar op een vlakke en schone ondergrond.
- 3) Haal de spuit uit de verpakking, maar laat de spuit nog even liggen. Verwijder de luchtbel niet. Deze zorgt ervoor dat alle vloeistof wordt ingespoten. Omdat u onder de huid spuit, komt de luchtbel niet in een bloedvat en kan dus geen schade aanbrengen.
- 4) Pak de spuit in uw hand en haal de beschermhoes van de naald. Raak de naald hierna niet meer aan en leg de spuit niet meer neer. Heeft u de naald per ongeluk aangeraakt? Pak dan een nieuwe injectiespuit.
- 5) Spuit in een huidplooi van uw buik. Spuit niet binnen 5 cm afstand van uw navel, een wond, litteken of een blauwe plek. U kunt ook in de bovenkant van uw bovenbenen prikken.

Zorg dat uw huid schoon is op de prikplaats.

- 6) Pak een huidplooi op de prikplaats tussen uw duim en wijsvinger.



- 7) Steek de naald in één beweging loodrecht in de huidplooi. U moet de naald helemaal in de huid prikken.
- 8) Druk de spuit rustig leeg, en dus ook de luchtbel.
- 9) Trek de naald met 1 beweging uit de huid en laat daarna pas de huidplooi los. Bij sommige spuiten komt de naald automatisch uit de huid.

Er kan een bloeddruppeltje ontstaan op de prikplek. Een pleister is meestal niet nodig.

Let op! Wrijf na het spuiten niet over de prikplek. Dit kan blauwe plekken veroorzaken of erger maken.

- 10) Lees in de bijsluiter wat u met de injectiespuit moet doen na gebruik. Gebruikte injectiespuiten horen niet bij het gewone afval. U kunt ze inleveren bij uw apotheek of weggooien bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval.