

Behandelschema stollingsstoornissen

Soort bloeding	Kenmerken	Wat te doen?	Bijkomende punten	Van Creveldkliniek raadplegen?
Blauwe plek of onderhuidse bloeditstorting	Verkleuring van de huid, soms met 'pit' er in.	Gaat vanzelf over	Bij erg veel pijn kan er meer aan de hand zijn, bijvoorbeeld een dieper gelegen bloeding.	Alleen bij grote bloeding en veel pijn
Kleine wondjes, schrammetjes en sneetjes	Weinig bloedverlies uit wond.	<ul style="list-style-type: none"> Gaan doorgaans vanzelf over Lokale druk kan helpen Koelen 	<ul style="list-style-type: none"> Liefst geen pleister De pleister voorzichtig verwijderen, het wondje kan opnieuw gaan bloeden. 	Alleen als het blijft bloeden
Grote (snij)wonden	Veel bloedverlies uit wond.	<ul style="list-style-type: none"> Drukverband aanleggen. Indien nodig wond laten hechten. Bij hechtingen ook stollingsfactoren overwegen. 	Alert zijn op mogelijk verder letsel, bijvoorbeeld een spierbloeding.	Altijd contact opnemen
Neusbloeding	Bloedverlies uit de neus.	<ul style="list-style-type: none"> Neus dichtdrukken, hoofd voorover buigen. Xylometazoline (Otrivin®) op watje doen en in neus stoppen. Sabbelen op iets koude. Cyklokapron lokaal (indien je bij wondje kan). Na 15-20 minuten hoort de bloeding te zijn gestopt. 	<ul style="list-style-type: none"> Kan gepaard gaan met veel bloedverlies. Sommige kinderen slikken het bloed in, als dit veel is, braken zij dat weer uit. 	Bij aanhoudend bloedverlies contact opnemen of bij terugkomende bloedingen.
Bloed in urine	Rood verkleuring van urine.	<ul style="list-style-type: none"> Behandeling met stollingsfactoren (thuis of in een ziekenhuis) Veel drinken 	Géén Cyklokapron en DDAVP.	Altijd contact opnemen
Bloed in ontlasting	<ul style="list-style-type: none"> Zwarte of rode kleur van ontlasting Soms buikpijn. 	Behandeling met stollingsfactoren, altijd in een ziekenhuis.	Kan gepaard gaan met veel bloedverlies.	Altijd contact opnemen



Soort bloeding	Kenmerken	Wat te doen?	Bijkomende punten	Van Creveldkliniek raadplegen?
Heftige menstruatie	<ul style="list-style-type: none"> Vaker dan elke 2 uur verschonen. Langer dan 7 dagen Bloedstolsels groter dan 1 euro munt. Duizelig, zwart voor ogen en bleek zien. Moe 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik Cyklocapron Contact met Van Creveldkliniek voor eventuele stollingsfactoren/DDAVP 		Indien nodig
Spierbloeding	<ul style="list-style-type: none"> Pijn in de spier Bewegingsbeperking Zwelling 	<ul style="list-style-type: none"> Behandeling met stollingsfactoren (thuis of in een ziekenhuis) Spier zo min mogelijk belasten (mitella, krukken) Eventueel een ijszak gebruiken tegen de pijn 	<ul style="list-style-type: none"> Kan gepaard gaan met veel bloedverlies, bijvoorbeeld ophoping van bloed in been. Nabehandeling van fysio om blijvende beperkingen te voorkomen is nodig. 	Altijd contact opnemen
Gewrichtsbloeding	<p>Eerst:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pijn en stijfheid gewricht. Bewegingsbeperking <p>Later:</p> <ul style="list-style-type: none"> Toename bewegingsbeperking Warm Dik (vergeleken met het gewricht aan de gezonde kant) 	<ul style="list-style-type: none"> Behandeling met stollingsfactoren (thuis of in een ziekenhuis). Gewricht zo min mogelijk belasten (mitella, krukken) Eventueel een ijszak gebruiken tegen de pijn. 	<ul style="list-style-type: none"> Als de bloeding is gestopt is het herstel nog niet volledig. Kans op nabloeding. Bij grotere bloedingen is nabehandeling van een fysiotherapeut nodig. 	Bij grote of onbekende bloeding altijd contact opnemen
Hoofdlletsel bij val van meer dan 1 meter hoogte, of vallen uit vaart	<ul style="list-style-type: none"> Hoofdpijn Misselijkheid Braken Duizelig Wegraking Bult op het hoofd 	Behandeling met stollingsfactoren, altijd in een ziekenhuis.	Bij val op het hoofd alert zijn op complicaties (sufheid, braken).	Altijd direct overleggen met de arts van de Van Creveldkliniek
Inwendige bloeding Bij harde stomp of stuur in buik	<ul style="list-style-type: none"> Vage buikpijn Soms geen/weinig klachten Misselijkheid Braken 	Behandeling met stollingsfactoren, altijd in een ziekenhuis.		Altijd direct overleggen met de arts van de Van Creveldkliniek