

Allergiehuidentest skinpricktest

Ten minste 3 dagen van tevoren stoppen:	
Merknaam	Stofnaam
1. Aeries	Desloratidine
2. Allerfre	Loratidine
3. Allergin	Cetirizine
4. Axid	Nizatidine
5. Azaron	Tripelennamine
6. Cinnipirine	Cinnarizine
7. Claritine	Loratidine
8. Cyclokapron	Tranexaminzuur
9. Doxergan	Oxomemazine
10. Fenistil	Dimentindeen
11. Incidal	Mebhydroline
12. Kestine	Ebastine
13. Mircol	Mequitazine
14. Mizollen	Mizolastine
15. Naxidine	Nizatidine
16. Nedeltran	Alimemazine
17. Pepcidin	Famotidine
18. Periactin	Cyproheptadine
19. Phenergan	Promethazine
20. Roxit	Roxatidine
21. Semprex	Acrivastine
22. Sibelium	Flunarizine
23. Suprimal	Meclozine
24. Tagamet	Cimetidine
25. Tavegil	Clemastine
26. Telfast	Fexofenadine
27. Tinset	Oxatomide
28. Triludan	Terfenadine
29. Xyzal	Levocetirizine
30. Zaditen	Ketotifen
31. Zantac	Ranitidine
32. Zyrtec	Cetirizine
Tenminste 10 dagen van tevoren stoppen	
a. Atarax b. Polaramine c. Vesparax	hydroxyzine Dexchlorfeniraminewaterstofmaleaat Combinatiepreparaat van hdroxyzine, brallobarbital en secobarbital
Prednison mag u doorgebruiken als u 25 mg per dag gebruikt of minder. Gebruikt u meer dan 25 mg, overleg dan met uw arts.	