

Eerste hulp bij een kind met de ziekte van Von Willebrand



Bij een **harde klap of val op het hoofd**: altijd direct contact opnemen met de ouders of het behandelcentrum. Kenmerken hoofdletsel: hoofdpijn, misselijk, braken, duizelig, wegraken, bult op het hoofd.

Tand door de lip of wisselen van tanden? Geef het kind een waterijsje of ijsklontjes. In geval van een **bloedneus** knijp de neus dicht. Indien de bloeding niet gestopt is na 20 minuten, neem contact op met de ouders.

Kenmerken van **gewrichts- en spierbloedingen**: pijn, bewegingsbeperking, zwelling, warmte, vermijden van het gebruik van aangedane deel. Laat het kind rusten, leg het aangedane deel hoog, koel eventueel met ijs. Neem contact op met de ouders.

Een **bloeding in de buik geeft** vage buikpijn die steeds erger wordt, en bloed bij braaksel, ontlasting, of urine. Neem direct contact op met ouders of behandelcentrum

Schrammen, wondjes en snijwonden: Behandel als ieder kind met een pleister en eventueel een drukverband. Indien de bloeding niet gestopt is na 20 minuten neem dan contact op met de ouders.

Bij twijfel altijd bellen!

De ouders willen graag precies weten wat er gebeurd is. Met name op welk deel van het lichaam het kind is gevallen, van welke hoogte en met welke vaart.

Contactformulier

Naam :

Adres:

Geboortedatum:

Stollingsstoornis:

Stollingsproduct:

Behandelcentrum:

UMC Utrecht – Afdeling Van Creveldkliniek

Telefoonnummer: 088 – 755 8450



UMC Utrecht

Moeder:

Huistelefoon:

Mobiel:

Werk:

Vader:

Huistelefoon:

Mobiel:

Werk: