

Mycofenolaatmofetil (CellCept®) bij constitutioneel eczeem (CE).

Afdeling Dermatologie/allergologie



Mycofenolaatmofetil
(CellCept®) bij constitutioneel
eczeem (CE).

Afdeling Dermatologie/allergologie, locatie UMC

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel mycopenolaatmofetil te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

Bij constitutioneel eczeem (CE) is er sprake van een ontsteking van de huid t.g.v. een overdreven afweerreactie van het lichaam op onschuldige stoffen. Mycofenolzuur remt deze afweerreactie van het lichaam, waardoor de ontsteking in de huid afneemt en het eczeem vermindert. Er is geen sprake van genezing van het eczeem.

Mycofenolaatmofetil remt het ontstekingsproces op de langere termijn. Het kan circa acht tot twaalf weken duren voordat u merkt dat het medicijn begint te werken. Soms wordt de behandeling met mycofenolaatmofetil in het begin tijdelijk (circa 3 weken) gecombineerd met prednison (zie aparte folder). Prednison is een middel dat snel effect heeft, maar minder geschikt is voor langdurige behandeling. Mycofenolaatmofetil wordt ook toegepast bij orgaantransplantaties, meestal echter in veel hogere doseringen.

Behandelmethode

CellCept® (mycofenolaatmofetil) is verkrijgbaar als tabletten van 500 mg en capsules van 250 mg. De gebruikelijke dosis bij eczeem is meestal 2x daags 2 tabletten van 500 mg. De dosis kan soms per patiënt iets afwijken. De tabletten moeten op de lege maag ingenomen worden. U kunt de tabletten doorslikken met voedsel, water of melk.

Bijwerkingen

- Hoofdpijn
- Vermoeidheid.
- Misselijkheid, braken, diarree.
- Koorts.
- Verhoogde vatbaarheid voor infecties.
- Afwijkingen in het bloedbeeld.

- Verstoorde aanmaak witte bloedcellen en daardoor grotere kans op infecties
- Verstoorde aanmaak bloedplaatjes en daardoor grotere kans op blauwe plekken, bloedneus.
- Verstoorde aanmaak rode bloedcellen en daardoor grotere kans op bloedarmoede.
- Verstoring van de functie van lever en alvleesklier.

Om de bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken zal er regelmatig controle van het bloed plaatsvinden.

Adviezen

- Lees de bijsluiter.
- Bespreek uw vragen met uw dermatoloog of huisarts.
- Geef bij bezoeken aan andere artsen (ook tandarts) altijd aan dat u mycofenolaatmofetil gebruikt.
- Gebruik nooit meer dan de voor u voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik alcohol met mate. Dit in verband met "overprikkeling" van de lever.
- Het gelijktijdig gebruik van bepaalde maagzuurremmers en bepaalde tabletten tegen herpesinfecties kunnen van invloed zijn op de werking van mycofenolaatmofetil: wanneer u deze middelen gebruikt, bespreek dit dan met uw dermatoloog of huisarts.
- Als u geopereerd moet worden, hoeft mycofenolaatmofetil niet te worden gestopt.
- Bij verschijnselen van infecties zoals koorts, verkoudheid, griep, hoesten, keelpijn, ernstige kortademigheid en steenpuisten, is overleg met uw dermatoloog of huisarts noodzakelijk: het kan zijn dat de mycofenolaatmofetil tijdelijk gestopt moet worden.
- Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw dermatoloog of huisarts noodzakelijk. Mycofenolaatmofetil moet tijdens de zwangerschap gestaakt worden.
- Als u mycofenolaatmofetil gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.

- Mannen met een kinderwens kunnen mycopenolaatmofetil blijven gebruiken.
- Als u kunnen mycopenolaatmofetil gebruikt, is er geen bezwaar tegen de 'grieprik'. Kortademigheid en hoesten.
- Verstoring van de leverfunctie.
- Vaccinatie (nodig bij sommige verre reizen) met verzwakt levend virus, zoals het gele koorts vaccin gaat niet samen met het gebruik van kunnen mycopenolaatmofetil. Ook vaccinaties tegen bof, mazelen, rode hond (BMR) of tuberculose mogen niet samen met kunnen mycopenolaatmofetil worden gebruikt.

Vragen

Neem gerust contact op met de polikliniek dermatologie of allergologie van het UMC Utrecht als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen.

Contact

Afdeling dermatologie/allergologie, Telefoonnummers:

Polikliniek allergologie: 088 75 563 31

Polikliniek dermatologie: 088 75 588 75

Ruimte voor aantekeningen

Ruimte voor aantekeningen

Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie
Afdeling Dermatologie

UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
T. 088 75 555 55
www.umcutrecht.nl

© 2018, UMC Utrecht

8 | UMC Utrecht

mei 2018, DIGD.04.074





Bezoekadres:
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT

Postadres:
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

www.umcutrecht.nl
T. +31 (0)88 75 555 55