



Behandeling nierkanker met Pembrolizumab en Lenvatinib

U hebt in overleg met uw arts besloten dat u een combinatiebehandeling krijgt met Pembrolizumab (immuuntherapie) en Lenvatinib (doelgerichte therapie) omdat u nierkanker hebt.


Algemeen



Pembrolizumab is een vorm van immuuntherapie.




Immuuntherapie is een behandeling die uw eigen immuunsysteem helpt om kankercellen te herkennen en te vernietigen.



Lenvatinib is een doelgerichte behandeling die de groei van tumoren remt door de bloedvaten naar de tumor te blokkeren.

Toediening Pembrolizumab



Pembrolizumab krijgt u elke 3 of 6 weken via een infuus op de dagbehandeling Medische oncologie. Hoe vaak u komt, hangt af van de soort tumor. Uw behandelend arts bespreekt dit met u. De afspraak op de dagbehandeling duurt 1,5 uur per keer.



Door het gebruik van Pembrolizumab kunt u in zeldzame gevallen een infuusreactie krijgen, zoals een benauwd of warm gevoel, rugpijn, buikpijn en/of koude rillingen.




We adviseren u om bij de eerste twee behandelingen niet zelf auto te rijden.

Toediening Lenvatinib



Lenvatinib is medicatie in tabletvorm. Op de dag van het eerste infuus Pembrolizumab, haalt u de pillen op bij de poliklinische apotheek van het UMC Utrecht. U begint die dag met het innemen van de medicatie, zonder pauze."




Neem elke ochtend één pil met een glas water en iets te eten, zoals bij het ontbijt. Zorg ervoor dat u de medicatie elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt.




Als u een pil vergeet en dit binnen 2 uur na het gebruikelijke tijdstip merkt, neem de pil dan alsnog. Bent u meer dan 2 uur te laat? Sla de vergeten pil dan over en neem de volgende pil op het gebruikelijke moment. Bespreek dit bij uw volgende bezoek aan het ziekenhuis met uw verpleegkundige of arts.

Afspraken in het ziekenhuis




Bloedprikken

Een uur voor uw afspraak met de arts of verpleegkundig specialist laat u bloedprikken op de poli bloedafname (route L, receptie 25, 08.00 - 17.00). Als patiënt van de afdeling oncologie krijgt u voorrang en hebt u geen afspraak nodig.



Polikliniek Medische Oncologie (B2west)


Op de polikliniek Medische Oncologie (B2west) bespreekt uw arts of verpleegkundig specialist eventuele bijwerkingen, uw bloeduitslagen en of uw behandeling veilig door kan gaan. Geef bijwerkingen altijd door, dit is belangrijk voor uw arts om te weten.




Dagbehandeling Medische Oncologie (B5west)

Tijdens uw afspraak op de dagbehandeling Medische Oncologie (B5west) krijgt u uw infuus met pembrolizumab en worden uw klachten nogmaals doorgenomen.


Uitleg bijwerkingen



Als er bijwerkingen ontstaan, komt dat meestal door een te actief immuunsysteem, dit noemen we auto-immuun bijwerkingen.




Bij auto-immuun bijwerkingen keert uw afweersysteem zich tegen uw gezonde lichaamscellen en valt het deze aan. Hierdoor kunt u op verschillende plekken in uw lichaam ontstekingen krijgen.



Meestal zijn de bijwerkingen mild, maar ze kunnen ook snel ernstig worden. Neem daarom altijd contact op met de polikliniek Medische Oncologie of buiten kantooruren met de dienstdoend oncoloog of SEH (088-7555555) als u na een behandeling nieuwe klachten krijgt.



Ernstige bijwerkingen gaan meestal niet vanzelf over, hiervoor is behandeling nodig om uw overactieve immuunsysteem te remmen, zoals met het medicijn prednison. Uw arts (of de dienstdoend oncoloog) beoordeelt welke medicatie u nodig hebt.



Uw behandeling met Pembrolizumab kan bijwerkingen veroorzaken aan organen die hormonen produceren zoals de bijniere, de schildklier en de hypofyse. Bijwerkingen van het hormoonstelsel gaan niet meer over en behandelen we levenslang met ondersteunende medicijnen.



Als u last hebt van bijwerkingen, bel dan bij aanhoudende of sterk verergerde klachten met de polikliniek Medische oncologie.

Neem altijd direct contact op bij onderstaande alarmsymptomen:


- Meer dan 4x per dag diarree of nachtelijke diarree.
- Aanhoudende koorts, langer dan 24 uur boven de 38,5°C.
- Langer dan 24 uur aanhoudende misselijkheid of braken of pijn in de mond waardoor drinken niet lukt.
- Bij een bloeddruk met een bovendruk van boven de 160/90 mmHg (advies: schaf thuis een bloeddrukmeter aan, via bijvoorbeeld uw apotheek).

Mogelijke bijwerkingen




Maag- darmklachten:

- misselijkheid en overgeven;
- buikpijn;
- diarree of verstopping;
- maagklachten, maagpijn;
- zuurbranden.




Trage werking schildklier:

- vermoeidheid;
- veranderde stemming;
- verlies van emotie en enthousiasme;
- het koud hebben;
- verstopping;
- droge huid.




Hoge bloeddruk:

- Meestal merkt u hier zelf niet veel van.
- Advies: schaf voor thuis een bloeddrukmeter aan. Neem de door u gemeten waarden mee bij elk bezoek.




Longklachten:

- benauwdheid;
- hoesten en/of kortademigheid;
- slijm ophoesten.




Huidklachten:

- Rode of droge huid en jeuk.
- Hand-voet-syndroom: binnenkanten van de handen en voeten zijn rood, gezwollen en pijnlijk.




Invloed op bloed:

- bloedarmoede;
- daling van witte bloedcellen en bloedplaatjes;
- meer kans op bloedingen en/of infecties.




Nierproblemen:

- vasthouden van vocht;
- weinig of niet kunnen plassen.



Klachten van de mond:

- pijn of zweertjes in de mond of op de tong;
- brandend gevoel in mond of keel.



Hartklachten:

- pijn op de borst, druk op de borst.



Hoofdpijn, druk op het hoofd.




Wazig zien.



Pijn of stijfheid in spieren of gewrichten.




Vermoeidheid.




Heesheid of veranderde stem.


In uw eigen omgeving



Het is niet nodig voorzorgsmaatregelen voor thuis te nemen.



Het verzorgen van patiënten die behandeld worden met Pembrolizumab en Lenvatinib is niet gevaarlijk voor familieleden, mantelzorgers en bezoekers.




U hoeft geen extra hygiënemaatregelen te nemen bij het gebruik van het toilet.


Anticonceptie




Immunotherapie kan schadelijk zijn voor een ongeboren baby.



Gebruik tot 6 maanden na de laatste behandeling betrouwbare anticonceptie om zwangerschap te voorkomen, zoals een anticonceptiepil, een spiraaltje, condoms of sterilisatie.



Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.



Scan de QR-code voor meer informatie.
www.umcutrecht.nl

Contactgegevens

Voor klachten of vragen kunt u de polikliniek van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur bereiken op telefoonnummer: **088 75 563 08**.

Bij spoed, in de avond/nacht en in het weekend: bel en vraag om de dienstdoende oncoloog of spoedeisende hulp op telefoonnummer: **088 75 555 55**.